

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO COLICA RENALE

- Paziente in PS per dolore lombare/fianco
- Valutazione clinico-anamnestica
- Stima della VAS
- Precoce somministrazione analgesica (VAS > 5)
- ECO apparato urinario

Se urolitiasi confermata e :

- 1) Calcolo di dimensioni < a 5 mm nell'uomo, 6 mm nella donna
- 2) Assenza di idronefrosi di III grado

Iniziare con FANS (oki, lixidol, artrosilene) + Morfina 2-5 mg

Ripetibili dopo 30 minuti

Regressione del dolore >> dimissione e controlli AMBULATORIALI

Se urolitiasi confermata e:

- 1) Calcolo di dimensioni > 6 mm
- 2) Idronefrosi III grado

Emocromo, calcemia, creatinina + Urologo

COSA FARE/NON FARE:

- 1) Stick urine prima dell'eco (Si perde tempo e si ritarda l'eco che ha bisogno della vescica piena)
- 2) Escludere AAA
- 3) Privilegiare morfina rispetto a tramadolo, fentanest, petidina, pentazocina
- 4) Gli antispastici sono controindicati (rallentano l'espulsione spontanea del calcolo)
- 5) Mai ritardare la terapia antidolorica (**NON CONFONDE L'APPROCCIO DIAGNOSTICO**)