

N.	Domanda	Risposta A	Risposta B	Risposta C	Risp. Esatta
1	Per la prima medicazione di una ferita è meglio usare:	Acqua ossigenata	Alcool	Alcool iodato	A
2	Una ferita ha più possibilità di complicanza tetanica quando:	E' causata da arma da fuoco	E' contaminata da acqua	E' contaminata da terra	C
3	In caso di ferita sospetta per contaminazione tetanica cosa si deve fare come primo soccorso?	Pulizia e disinfezione	Tamponare la ferita	Fare impacchi gelati	A
4	Quale dei seguenti sintomi non si manifesta nel colpo di sole?	Cefalea e vertigini	Abbassamento della temperatura corporea	Sudorazione e profusa	B
5	Cosa non dobbiamo fare nel colpo di calore?	Ventilare	Far bere acqua con un po' di sale	Fare impacchi gelati	C
6	In caso di congelamento non si deve:	Riscaldare la parte colpita con sorgenti di calore o borse d'acqua calda	Massaggiare e la parte colpita	Allentare tutto ciò che rallenta la circolazione	A
7	In caso di iniziale congelamento delle dita della mano bisogna:	Immergere le mani in acqua fredda	Immergere le mani in acqua calda	Frizionare e massaggiare la mano	C
8	Il dolore più tipico dell'infarto cardiaco è avvertito:	A sinistra sul cuore	Al centro del torace	Tra le scapole	B
9	Quali sono i sintomi di un arresto cardio circolatorio?	Perdita di coscienza	Lentezza nei movimenti	Comparsa di un colorito roseo	A
10	La sete intensa può essere sintomo di:	Colpo di sole	Colpo di calore	Assideramento	B
11	In caso di emorragia arteriosa da ferita da arma da fuoco dove occorre effettuare la compressione emostatica?	Sulla ferita	A valle della ferita	A monte della ferita	C

12	In caso di sangue al naso (epistassi) è consigliabile:	Tenere le dita premute sulle cartilagini del naso con la testa leggermente e chinata in avanti	Rovesciare all'indietro la testa	Tappare il naso con cotone idrofilo	A
13	In caso di perdita di coscienza a seguito di un trauma e senza più gravi sintomatologie occorre:	Mettere seduto il soggetto	Sdraiare il soggetto a testa in alto	Girare il soggetto sul fianco	C
14	Per una corretta respirazione artificiale il capo dell'infortunato deve essere tenuto:	Rovesciato all'indietro	Con il mento che tocca il torace	Di lato	A
15	Il trasporto in auto di un infortunato deve essere effettuato:	Tenendo seduto immobilizzato il soggetto	Tenendo il soggetto possibilmente sdraiato ed evitando bruschi movimenti	Ponendo il soggetto in una posizione comoda e compiendo velocemente il trasporto	B
16	Nel caso del classico svenimento (lipotimia) il soggetto va posto:	Seduto	Sdraiato a gambe aperte	Sdraiato a gambe sollevate	C
17	Nel caso di puntura di insetto la complicanza immediata più grave è:	La reazione allergica	L'emorragia	L'infezione	A
18	In caso di frattura all'avambraccio è necessario immobilizzare:	Il polso	Il gomito	il polso e il gomito	C
19	Nel caso di un soggetto in cui si sospetta la frattura della colonna vertebrale il trasporto sarà effettuato:	Immobilizzando gli arti	Su un piano rigido	Immobilizzando testa e bacino	B
20	Nel caso di un soggetto in arresto cardiaco, e quindi anche respiratorio, è meglio:	Effettuare la respirazione artificiale	Effettuare il massaggio cardiaco	Effettuare contemporaneamente il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale	C

21	Come occorre intervenire nel caso di punture di vespe, api o calabroni?	Si cerca di estrarre delicatamente il pungiglione dell'insetto, si disinfetta e si applica una pomata antistaminica	si lascia in sede il pungiglione dell'insetto e si disinfetta	Si lava bene la zona colpita, si esegue un piccolo taglio e si applica una pomata antistaminica	A
22	Nella medicazione di una ferita la garza deve essere fissata con cerotto:	A monte e a valle	Su tutto il contorno	A croce	B
23	In caso di ferita profonda da arma da fuoco alla coscia con emorragia arteriosa è necessario:	Comprimer e fortemente l'inguine dallo stesso lato	Posizionare il laccio emostatico	Comprimer e fortemente sulla ferita	A
24	In caso di emorragia il laccio emostatico è posto correttamente quando:	E' a pochi centimetri dalla ferita	E' a circa 20 centimetri dalla ferita	E' stretto fino ad impedire la fuoriuscita del sangue	C
25	In caso di ustione è necessario in primo luogo:	Lavare l'ustione con acqua fredda	Applicare cotone idrofilo per coprire la zona ustionata	Asportare le vesciche dopo averle perforate	A
26	Come si distingue una emorragia arteriosa da una venosa?	Il colore del sangue è più rosso nel caso di emorragia venosa	Di norma la velocità di uscita del sangue è maggiore e a volte ritmica nel caso di emorragia arteriosa	Il colore del sangue è più scuro nel caso di emorragia venosa	B
27	Come si caratterizza il morso della vipera?	Per la presenza di due forellini	Per la presenza di quattro forellini distanti fra loro circa 1 centimetro	Per la presenza del segno di tutti i denti e di due forellini circolari distanti tra loro da 1 a 3 centimetri	C

28	Come si riconoscono le vipere dagli altri serpenti non velenosi?	La testa ha forma oblunga	La testa è triangolare e la pupilla è verticale	La coda è lunga e fusiforme	B
29	Quali sono i sintomi nel soggetto morso da una vipera?	Immediato intenso dolore locale	Delirio dopo circa un'ora	Svenimento dopo circa 10 minuti	A
30	Cosa è consigliabile fare in caso di morso di vipera?	Succhiare il sangue dalla ferita	Incidere con un taglio che unisca i due fori del morso	Applicare il laccio emostatico a monte del morso	C