

Definizione Codici

Protocollo di Triage – P.S. O.S.A.

CODICE GIALLO

Apparato cardio –
respiratorio



- Dolore toracico di sospetta natura coronarica (vedi protocollo)
- Dispnea oggettiva con saturazione O₂ > 90% e < 95%
- Cardiopalmo o aritmia totale con riscontro E.C.G.

Sindromi
neurologiche



- Cefalea: primo episodio od episodio differente da precedenti
- Cefalea, senza segni neurologici associata a TC > 38°C
- Vertigini associate ad alterazione di un parametro vitale
- Sincope recente riferita
- Sospetto di ictus
- Perdita improvvisa del visus anche monolaterale
- Visione "annebbiata" ad insorgenza improvvisa in atto
- Stati confusionali cronici in fase di riacutizzazione
- Delirio
- Disorientamento spazio-temporale
- Stati post critici

Patologie
addominali e
lombari



- Dolore addominale acuto, paziente sofferente
- Dolore addominale acuto, dispnea, pallore e sudorazione
- Dolore addominale acuto associato a diarrea intensa e/o vomito
- Dolore addominale acuto in paziente > 70 anni
- Dolore reno-ureterale severo
- Ematuria macroscopica in atto
- Ritenzione acuta di urina

Emorragie



- Epistassi massiva in atto
- Epistassi in atto in soggetto in T.A.O. o in sindrome ipertensiva
- Epistassi in atto non controllabile
- Ematemesi o melena recenti (12 ore)
- Enterorragia recente (12 ore)

Traumatologia
adulti



- Presenza di uno o più indicatori di trauma maggiore o fattori di rischio
- Frattura esposta di un arto in assenza di sanguinamenti copiosi
- Frattura non esposta di 2 segmenti ossei
- Frattura unica anche non esposta di ossa lunghe
- Fratture del bacino
- Lussazione di grosse articolazioni
- Trauma cranico commotivo riferito
- Trauma cranico e del rachide con segni neurologici e/o cefalea
- Trauma toracico con dispnea ma parametri non minacciosi
- Trauma addominale chiuso senza segni di shock
- Contusioni e/o ferite del bulbo oculare con deficit visivi
- Ustioni >10% ma < 20%
- Vaste ferite al capo sanguinanti

Altre patologie /
sindromi
psichiatriche



- Intossicazioni acute
- Reazione cutanea generalizzata senza sintomi sistemici in pz. con anamnesi di anafilassi
- Dolore oculare intenso associato a disturbi del visus
- Paziente in stato di agitazione psicomotoria non violento
- Psicosi acuta al momento controllabile da accompagnatore