

Definizione Codici

Protocollo di Triage – P.S. O.S.A.

CODICE ROSSO

Parametri vitali



- Alterazione o assenza di uno o più parametri vitali
 - ✓ G.C.S. < 13
 - ✓ F.C. < 40 o > 150
 - ✓ SpO₂ < 90%
 - ✓ F.R. < 10 o > 34
- Perdita di coscienza in atto (traumatica o non)

Apparato cardio –
respiratorio



- Arresto respiratorio
- Arresto cardiocircolatorio
- E.P.A.
- Dolore toracico con alterazione parametri vitali (vedi protocollo)

Sindromi
neurologiche



- Cefalea acuta con associati segni neurologici (stato confusionale, disartria, segni di lato e/o meningei)
- Stato confusionale con T.C. > 38° e/o convulsioni in atto
- Ictus con insorgenza < 3 ore

Patologie
addominali e
lombari



- I.R.A. con rumori respiratori udibili e cianosi
- Dolore lombare atraumatico grave, di recente insorgenza, lancinante o lacerante, irradiato o meno all'addome, in paziente con età > 50 anni con fattori di rischio presenti
- Aneurisma noto dell'aorta con dolore lombare atraumatico in atto

Emorragie,
traumatiche e non



- Ematemesi in atto
- Emorragie massive in atto

Traumatologia
adulti



- Compromissione di funzioni vitali o alterazione di uno o più parametri
- Politraumatizzato
- Trauma toraco/addominale in paziente in stato di gravidanza
- Ferite penetranti del torace (collo, testa, addome e pelvi)
- Traumi importanti con segni di deficit neurologici
- Traumi facciali coinvolgenti la funzione visiva e/o vie aeree superiori
- Amputazione prossimale di un arto
- Ustioni di III° > 10% e II° > 25%
- Fratture esposte plurime
- Trauma vertebro-midollare con:
 - ✓ deficit neurologico sensitivo e motorio
 - ✓ respiro diaframmatico ed affannoso
 - ✓ perdita controllo degli sfinteri
 - ✓ traumi associati in altri distretti

Traumi
pediatrici



- G.C.S. < 12
- Polsi periferici assenti
- Emorragia franca
- Pallore o cianosi
- Emiparesi o paralisi
- Disturbi della vigilanza e dell'equilibrio
- Difficoltà a svegliarsi
- Amputazione **distale** di un arto
- Frattura **unica** esposta di un osso lungo
- Compromissione neuro-vascolare dell'arto colpito
- Traumi che interessano la funzione visiva
- Ustione > 15%
- Età < 2 anni con trauma cranico o rachideo o toracico od addominale anche solo sospetto

Altre patologie /
sindromi
psichiatriche



- Reazione allergica con angioedema del volto e/o della lingua
- Dolore scrotale acuto con tumefazione insorto entro le 2 ore
- Agitazione psicomotoria in paziente violento per sé e per gli altri
- Etilismo acuto non controllabile
- Psicosi acuta non controllabile da eventuale accompagnatore