
ALLEGATO 1 - Dolore Toracico non traumatico

Protocollo di Triage - P.S. O.S.A.

Triage di I livello



Dolore Toracico non traumatico

Protocollo di Triage – P.S. O.S.A.

Triage di II livello

- Alterazione del sensorio (GCS < 13)
- Sudorazione profusa e/o pallore
- Cianosi marcata
- Severa compromissione respiratoria

(F.R. < 10 o > 34)

- F.C. < 40 o > 150
- $SpO_2 < 90\%$
- Tratto ST 1all'E.C.G.


NO

- F.C. < 50 o > 120 o aritmia totale non nota
- P.A.S. < 90 mmHg
- P.A.D. > 120 mmHg
- Alterazioni E.C.G. non ST 1

Nessuna alterazione E.C.G. né nei punti precedenti



Allertare Sale 'Emergenze'
Ingresso Immediato



Rivaluta ogni 30'. Se barellato attende in sala Triage II

Dolore Toracico non traumatico

Protocollo di Triage – P.S. O.S.A.

Sistema PQRST

- Posizione (retrosternale, interscapolare, addominale sovraombelicale)
- Qualità (oppressivo e non modificato dalla digitopressione, dal respiro e dal movimento)
- Irradiazione (arto sin., spalla ds., entrambe le braccia, giugulo, mandibola)
- Sintomi Associati (diaforesi, dispnea, astenia, stordimento, sincope)
- Tempo (>20 minuti, o ingravescente nelle ultime 48 ore)

Il dolore viene considerato TIPICO per SCA se sono presenti <u>almeno due</u> dei fattori elencati

Criteri di inclusione nel presente protocollo

• Tutti i dolori toracici sovraombelicali non traumatici

Criteri di esclusione dal presente protocollo

Toracoalgia traumatica

L'infermiere del TRIAGE II, valutato il paziente, appone anche egli il proprio numero di matricola, validando la conferma o modificazione del codice nella pagina di 'Priamo' al di sotto dell'assegnazione effettuata dall'infermiere del TRIAGE I.