

# **CROCE ROSSA ITALIANA**

## **VOLONTARI DEL SOCCORSO**

# **GRAVIDANZA E PARTO**




**V.d.S. Marcello CESINARO**

# **OBIETTIVO**

**COMPORAMENTO E AZIONI DA  
ADOTTARE NEL CASO IN CUI LA  
PAZIENTE SIA IN GRAVIDANZA  
OPPURE SI PROSPETTI UN  
PARTO SUBITANEO.**



# GRAVIDANZA




**PERIODO DURANTE IL QUALE L'APPARATO RIPRODUTTORE DELLA DONNA SUBISCE DEI CAMBIAMENTI DOVUTI ALLA CRESCITA E ALLO SVILUPPO DEL CONCEPITO ( IL FETO ).**



# GRAVIDANZA

## STRUTTURE ANATOMICHE INTERESSATE




**OVAIE** : ghiandole dove maturano le cellule uovo;

**UTERO** : organo cavo, a forma di tasca, dove si sviluppa il feto;

**VAGINA** : canale di collegamento con l'esterno.

# GRAVIDANZA

## CAMBIAMENTI ANATOMICI NELLA GESTAZIONE




### UTERO

- ✚ L'UTERO, CON LA CRESCITA DEL FETO, HA UNA DILATAZIONE PROGRESSIVA;
- ✚ NEL 1° TRIM. L'OVULO FECONDATO SI TRASFORMA IN EMBRIONE E A PARTIRE DALLA 8° SETT. SI FORMA IL FETO;
- ✚ ALLA 4° SETT. IL CUORE COMINCIA A BATTERE E ALLA FINE DELLA 8° SETT. IL SISTEMA CARDIOVASC. E' COMPLETO.

# GRAVIDANZA

## CAMBIAMENTI ANATOMICI NELLA GESTAZIONE




### SACCO AMNIOTICO

- ✚ DETTA ANCHE BORSA DELLE ACQUE, HA LA FUNZIONE DI PROTEZIONE DEL FETO;
- ✚ E' COMPOSTO DA UNA MEMBRANA E CONTIENE IL LIQUIDO AMNIOTICO.

# GRAVIDANZA

## CAMBIAMENTI ANATOMICI NELLA GESTAZIONE




### PLACENTA

- ✚ HA LA FUNZIONE DI OSSIGENARE E NUTRIRE IL FUTURO BAMBINO;
- ✚ SI SVILUPPA CON IL FETO E VIENE ESPULSO DOPO LA NASCITA.

# GRAVIDANZA

## CAMBIAMENTI ANATOMICI NELLA GESTAZIONE



### CORDONE OMBELICALE

- + UNISCE IL FETO ALLA PLACENTA ;
- + CONTIENE I VASI SANGUIGNI ATTRAVERSO I QUALI IL NASCITURO ASSUME OSSIGENO E NUTRIMENTO DAL SANGUE DELLA MADRE.

# URGENZE IN GRAVIDANZA

DURANTE LA GRAVIDANZA LA GESTANTE PUO' AVERE UNA PREMATURA PERDITA DELLE ACQUE , RIFERITI DOLORI ADDOMINALI O ALTRO, CASI NEI QUALI IL **118** RICHIEDE UN INTERVENTO DI URGENZA:

- ❖ **Minacce di aborto (sanguinamenti)**
- ❖ **Sanguinamenti nel 3° mese**
- ❖ **Svenimenti in gravidanza avanzata**
- ❖ **Gestosi**
- ❖ **Traumi**



# URGENZE IN GRAVIDANZA

- ✚ **TRANQUILLIZZARE LA GESTANTE, CHIEDERE A QUALE MESE E' LA CRESCITA DEL FETO, VALUTAZIONE PARAMETRI;**
- ✚ **CHIEDERE SE PRIMA GRAVIDANZA, SE LE PRECEDENTI O LA STESSA HANNO CREATO QUALCHE PROBLEMA;**
- ✚ **EVENTUALI CURE MEDICHE, NOME DEL DOTTORE DI FIDUCIA;**
- ✚ **OSPEDALIZZARE DISTESA LATO SINISTRO, LIBERARE DA INDUMENTI ;**
- ✚ **SE PERDITA DELLE ACQUE, NON FAR CAMMINARE LA PAZIENTE E PORTARLA IN OSPEDALE DISTESA CON LE GAMBE FLESSE.**

**POSSIBILMENTE, PREVEDERE SEMPRE  
UNA DONNA IN EQUIPAGGIO.**



# URGENZE IN GRAVIDANZA

## LE METRORRAGIE



**EMORRAGIA IN GRAVIDANZA:**

- + P.L.S. ANTISHOCK ANCHE SE COSCIENTE;**
- + APPORRE ASSORBENTI ESTERNAMENTE;**
- + OSPEDALIZZARE NELLA STESSA POSIZIONE;**
- + PORTARE IN P.S. CAMPIONE EMATICO;**



**PAUSA**




# IL PARTO

**NELLO SPECIFICO E' TRATTATO IL PARTO SPONTANEO, NEL CASO IN CUI LO STESSO E' PRECIPITOSO O LE CIRCOSTANZE LO RENDANO NECESSARIO, CON IL NEONATO CHE SI PRESENTA DI TESTA;**



# IL PARTO



- ✚ LE CONTRAZIONI DELL'UTERO INIZIANO DA 20 A 4 ORE PRIMA DEL PARTO;
- ✚ LE CONTRAZIONI DURANO CIRCA UN MINUTO, AD INTERVALLI CHE VANNO DAI 20 – 15 MINUTI A 1 – 2 MINUTI;



# Doglie

Controllare la frequenza e la durata delle contrazioni e se

Tempo della contrazione  30 sec/1 min.

Frequenza  2/3 min.

**Il parto è imminente!**



# Segni e sintomi

In caso di parto imminente:

- ✓ **Doglie ravvicinate**
- ✓ **“Rottura delle acque”**
- ✓ **Sensazione di necessità di defecare**
- ✓ **Presentazione di parte del bambino**



# VALUTAZIONE PRELIMINARE

Valutare se il parto si sta svolgendo sul posto:

- ✓ Domande mirate
- ✓ Parametri vitali donna

**NON sta per nascere** → **OSPEDALIZZARE**

**STA per nascere** → **FERMI SUL POSTO  
e attivare A.L.S.**



# ASSISTENZA AL PARTO

- # **CHIEDERE DATA PRESUNTA DEL PARTO E SE HA GIA' PARTORITO ALTRE VOLTE;**
- # **DA QUANTO TEMPO E FREQUENZA DELLE CONTRAZIONI;**
- # **PARLIAMO FREQUENTEMENTE CON LA DONNA, DARE OPPORTUNO SOSTEGNO PSICOLOGICO;**
- # **VALUTAZIONE PARAMETRI VITALI;**
- # **ALLERTARE A.L.S. .**





# ASSISTENZA AL PARTO

✚ **FACCIAMO DIVARICARE LE GAMBE PER ESAMINARE I GENITALI;**

✚ **ACCERTARSI DELLA PERDITA DELLE ACQUE;**



✚ **SPIEGARE E MOTIVARE ALLA DONNA LE AZIONI CHE ANDREMO A FARE ;**

✚ **CONTENERE L'INVADENZA DI PERSONE COINVOLTE EMOTIVAMENTE ;**




# ASSISTENZA AL PARTO

- ✚ SOLITAMENTE IL VISO DEL NEONATO SI PRESENTA VERSO IL BASSO PER POI RUOTARE SPONTANEAMENTE VERSO LA COSCIA DESTRA;
- ✚ POSIZIONIAMO LA MANO DESTRA SUL PERINEO DELLA DONNA CON L'AUSILIO DI UNA GARZA, SIA PER EVITARE UNA LACERAZIONE, SIA PER PROTEGGERE IL BIMBO DA EVENTUALI FECI;






# ASSISTENZA AL PARTO

- ✚ LA PARTORIENTE DEVE AIUTARE LO SFORZO CON LA RESPIRAZIONE;
- ✚ NON CERCARE DI ESTRARRE IL BIMBO MA SOSTENIAMOLO E ASSECONDIAMO I MOVIMENTI CON CAUTELA;
- ✚ ATTENZIONE, TENERE SALDAMENTE IL NEONATO PERCHE' COPERTO DA VERNICE CASEOSA, QUINDI PUO' SCIVOLARE;
- ✚ ANNOTARE L'ORA DELLA NASCITA!!!!



# ASSISTENZA AL NEONATO

- ✚ ASCIUGHIAMOLO ED ASPIRIAMO LE PRIME VIE AEREE.
- ✚ SE IL NEONATO NON RESPIRA STIMOLARLO CON DEI COLPETTI ;
- ✚ SE IL NEONATO NON RESPIRA ANCHE SE STIMOLATO PROCEDERE CON R.C.P. ;
- ✚ APPORRE DUE LEGACCI O CORD-CLAMP SUL CORDONE OMBELICALE ENTRO 2 min. ;
- ✚ AVVOLGIAMO IL NEONATO IN UN SOFFICE ASCIUGAMANO, CALDO E PULITO;



# ASSISTENZA AL NEONATO

Assistiamo il neonato nei  
primi 30 sec dalla nascita:


- ✓ **P** (Posizione)
- ✓ **A** (Asciugare)
- ✓ **R** (Riscaldare)
- ✓ **A** (Aspirare)
- ✓ **T** (Tattile)
- ✓ **A** (Assesment = Valutazione)



# ASSISTENZA POST-PARTO


## SECONDAMENTO :

- + ATTENDERE L'ESPULSIONE SPONTANEA DELLA PLACENTA (**NON** tirare il cordone ombelicale);



## EMORRAGIA DOPO IL PARTO :

- + POSIZIONE ANTISHOCK;
- + APPORRE ASSORBENTI ESTERNAMENTE;
- + MASSAGGIARE L'ADDOME CON MOVIMENTO CIRCOLARE;
- + OSPEDALIZZARE NELLA STESSA POSIZIONE.



# ASSISTENZA AL PARTO:NOTE

- ✚ SE IL CORDONE OMBELICALE SI AVVOLGE INTORNO AL COLLO **ALLERTARE 118** , CERCARE CON MOLTA CAUTELA DI DISTRICARLO SE VIENE RITENUTO NECESSARIO E SE NON SI RIESCE, PORRE LA TESTA DELLA DONNA PIU' BASSA DEL TRONCO, OSSIGENO ALTI FLUSSI O COME INDICATO DAL 118
- ✚ NON TAGLIARE IL CORDONE OMBELICALE (ATTO MEDICO);
- ✚ NEL CASO IN CUI IL NEONATO SI PRESENTI CON I PIEDI (PARTO PODALICO), NON FACCIAMO MANOVRE AZZARDATE.  
**ALLERTARE 118 -A.L.S.**



**... MA NON  
SONO NATO  
SOTTO UN  
CAVOLO??**



***QUALCHE DUBBIO?***



# CONCLUSIONI

**ASSISTERE UN PARTO AVVIENE MOLTO DI RADO, MA SI DEVE COMUNQUE ESSERE PREPARATI E RIVEDERE PERIODICAMENTE LE METODOLOGIE DA APPLICARE, POICHE' LE STESSE SI POSSONO DIMENTICARE.**



Grazie per l'attenzione...